

PATIENTENINFORMATION:

Gewinnung von Sammelurin

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

Ihr Arzt hat Sie aufgefordert, Urin **24 Stunden** lang zu sammeln. Bitte beachten Sie während der Urinsammlung die nachfolgenden Punkte auf der Rückseite.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit

Achtung! In dem beiliegenden Röhrchen befindet sich Säure, sie dient der Stabilisierung der Urinprobe. Bitte entleeren Sie das Röhrchen vorsichtig unmittelbar nach der ersten Urinabgabe in den Sammelbehälter.

Für die Bestimmung von :

- *Katecholaminen (Adrenalin, Nordadrenalin, Dopamin),*
- *Vanillinmandelsäure, Homovanillinmandelsäure,*
5-Hydroxyindolessigsäure
- *Metanephrin, Normetanephrin,*
- *sowie die Bestimmung von 17-Hydroxycorticoide,*
- *Magnesium und Oxalat.*



BITTE BEACHTEN SIE:

1. Trinken Sie nicht mehr als üblich. Verzichten Sie völlig auf Alkohol und Koffein sowie Schwarztee.
2. Entleeren Sie morgens nach dem Aufstehen Ihre Blase. Dieser Urin wird nicht gesammelt!
3. Von nun an **jeden** Urin – auch beim Stuhlgang – sammeln und in das Sammelgefäß geben. Stellen Sie das Sammelgefäß **kühl** und nicht in helles Licht.
4. Entleeren Sie am nächsten Morgen nach dem Aufstehen wieder Ihre Blase vollständig und fangen diese letzte Portion ebenfalls im Sammelgefäß auf.
5. Das Sammelgefäß hat eine Einteilung zum Ablesen der Urinmenge. Schreiben Sie diese Menge auf. Wenn Sie von Ihrem Arzt zwei gelbe Spritzen (Urinmonovetten) erhalten haben, füllen Sie diese vollständig mit Sammelurin. Vorher den Urin bitte durch vorsichtiges Schwenken noch einmal gut durchmischen. Oder bringen Sie die gesamte Menge des Urins unmittelbar nach Sammelende zum Arzt.

